

2026二工大教职工健康体检 A 套餐（瑞慈）

体检项目		男性	女性		临床意义
			未婚	已婚	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）	●	●	●	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科检查	心、肺听诊，腹部触诊	●	●	●	心肺有无异常，肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科检查	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	●	●	●	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形、皮肤有无异常改变等
眼科	视力检查(必选)	●	●	●	视力是否正常
	眼科检查(外眼)(必选)	●	●	●	眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等
	眼底检查(眼底)	●	●	●	眼底有无黄斑变性和动脉硬化等
	测眼压	●	●	●	眼压是否正常，排除原发性青光眼、原发性视网膜剥离等疾病。
耳鼻喉检查	外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部	●	●	●	耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等
妇科（已婚项目）	常规检查（必选）			●	女性生殖器有无异常病变，有无宫颈炎及阴道感染等。
	白带常规（必选）				
	液基薄层细胞学检测（TCT）			●	宫颈癌筛查，比宫颈刮片灵敏度高，准确性好。
	HPV-DNA(16/18)			●	筛查宫颈癌高危人群的重要指标。
血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	●	●	●	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，炎症感染等。
肝功能	血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)	●	●	●	是肝细胞受损最敏感的指标，升高：主要见于急性传染性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎，胆囊炎等。
	血清门冬氨酸氨基转移酶（AST）	●	●	●	可以检测肝细胞、心肌细胞受损情况。
	血清γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)	●	●	●	是用于诊断肝、胆系统疾病的敏感指标，酒精性肝损伤的监测指标。
	血清碱性磷酸酶(ALP)	●	●	●	是肝胆系统和骨骼系统疾病诊断的酶学指标
	血清总胆红素(T-BIL)	●	●	●	总胆红素升高提示有黄疸，包括肝细胞性黄疸，阻塞性黄疸，溶血性黄疸。
肾功能	血清尿素（必选）	●	●	●	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，尿毒症等。
	血清肌酐（必选）				
	血清尿酸	●	●	●	可提示嘌呤代谢有无异常，升高常见于如高尿酸血症、痛风及肾功能损害等。
血脂	1.总胆固醇(TC)	●	●	●	胆固醇升高是导致高血压、冠心病、心肌梗死、动脉粥样硬化的高度危险因素。
	2.甘油三脂（TG）	●	●	●	甘油三脂升高见于：肥胖症，脂肪肝，糖尿病，动脉粥样硬化，高血压等。
	3.高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	●	●	●	高密度脂蛋白胆固醇认为是抗动脉硬化的保护因素。降低是冠心病、脑血管疾病的危险因子。
	4.低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	●	●	●	LDL-C是坏胆固醇，升高是冠心病、心肌梗死、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素。
	5.动脉粥样硬化指数(1-4必选)	●	●	●	动脉粥样硬化指数升高，发生冠心病的危险性也升高。
血糖	空腹血糖(FPG)	●	●	●	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病，了解血糖控制情况等。
	糖化血红蛋白（HbA2c）	●	●	●	可反映检查前1-2个月的平均血糖水平，是糖尿病的筛查指标之一。
甲状腺功能五项	T3 T4 TSH FT3 FT4	●	●	●	是诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能减退等疾病的指标。
肿瘤标志物（男5项）	AFP、CEA、CA199、PSA、FPSA、PSA/FPSA	●			一次同时检测五项肿瘤标志物，升高可提示肝癌、肺癌、前列腺癌、胰腺癌等。
肿瘤标志物（女5项）	AFP、CEA、CA19-9、CA125、CA15-3		●	●	一次同时检测五项肿瘤标志物，升高可提示肝癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等。
尿常规	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查。	●	●	●	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等。
心电图	心电图	●	●	●	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
低剂量螺旋CT	肺部	●	●	●	最主要的是可以早期发现肺部疾病，包括肺部的炎症等其他性病变。

高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾彩超	●	●	●	检查肝胆脾胰肾各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	甲状腺超声	●	●	●	检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等
	前列腺超声	●			检查前列腺是否有增生或肿瘤。
	双侧乳房超声		●	●	检查乳腺是否有结节或乳腺癌。
	子宫附件超声		●		检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
	阴超（已婚项目）			●	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
幽门螺旋杆菌检查	C-13（呼气）	●	●	●	是幽门螺旋杆菌感染的确诊试验。此菌感染与胃炎、胃溃疡、胃癌等发病有密切关系。
骨密度超声	超声检测	●	●	●	诊断骨质疏松，预测骨折风险。
高清彩色多普勒B超（二选一）	颈动脉彩超检查	●	●	●	了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉斑块和颈动脉血流情况。
	心脏彩超	●	●	●	心血管疾病的重要诊断方法，对心脏瓣膜病诊断准确率高，对心脏病、冠心病、心肌梗塞并发病及肺心病有较大的辅助诊断价值。
血流变	血粘度检测	●	●	●	了解血液黏度变化，主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。
心脑血管疾病风险指标	同型半胱氨酸(HCY)	●	●	●	血同型半胱氨酸升高的高血压，称为H型高血压，它是脑卒中等心脑血管疾病的独立危险因素。
肿瘤标志物	糖链抗原242（CA242）	●	●	●	与胰腺癌、结肠癌、胃癌等胃肠道恶性肿瘤相关，但胃肠道良性疾病也可见升高
	糖链抗原72-4（CA72-4）	●	●	●	是胃肠道恶性肿瘤标志物，也是检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可见升高。
早餐		●	●	●	
报告	电子	●	●	●	

赠送下列加项包六选一					
加项包一： 核磁加项包 (头颅或头颅血管核磁二选一)	核磁包1：核磁检查（MRI能清晰区分灰质、白质、脑室、脑沟等结构，帮助发现微小病变（如早期脑梗死、脑炎病灶）				
	核磁检查	头颅核磁		头颅MRI是借助磁场和射频波对人体脑部进行高分辨率断层成像的技术，主要用于评估脑组织结构、诊断病变（如肿瘤、血管异常）、追踪疾病进展及指导治疗，具有无辐射、软组织对比度高的优势。	
	核磁包2：核磁检查（检测动脉粥样硬化导致的血管狭窄（如颈动脉、大脑中动脉），或急性脑梗死的责任血管闭塞，评估脑血流				
	核磁检查	头颅血管核磁		颅内血管核磁（MRA/MRI）主要用于检查脑血管结构及血流异常，包括动脉瘤、血管畸形、狭窄或闭塞、动脉粥样硬化等，具有无创、高分辨率的特点，是筛查和诊断脑血管疾病的重要工具。	
加项包二： CT扩展包 (颈椎或腰椎CT二选一)	颈椎CT 可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断。				
	CT放射检测	颈椎CT		CT具有扫描速度快，覆盖面积大，采集信息量多等优点，在短时间内能够对全身各脏器进行检查，可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断；特别是对早期病变的发现、已患疾病疗效判定等有着显著的临床意义。	
	腰椎CT 可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断。				
	CT放射检测	腰椎CT		CT具有扫描速度快，覆盖面积大，采集信息量多等优点，在短时间内能够对全身各脏器进行检查，可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断；特别是对早期病变的发现、已患疾病疗效判定等有着显著的临床意义。	
加项包三： 肿瘤升级包	(NSE) 作为一种糖酵解途径关键酶，主要分布于神经及神经内分泌组织，其血清水平异常升高常提示小细胞肺癌等神经内分泌肿				
	肿瘤标志物	神经元特异性烯醇化酶（NSE）		对小细胞肺癌、神经母细胞瘤的早期诊断及评估预后有临床重要意义。	
	肿瘤标志物	细胞角蛋白19片段测定		对非小细胞肺癌比较敏感，尤其是肺鳞癌。	
	肿瘤标志物	β2微球蛋白检测（β2-MG）		用于监测与评价肾功能状态的一个指标，炎症（一般上尿路感染）、肾衰、肾炎、肾脏肿瘤可能会导致该指标异常。	
加项包四： 心脑血管升级包	心血管检查，超敏C反应蛋白（CRP是肝脏合成的急性期反应蛋白，在感染、创伤或炎症时迅速升高。冠状动脉钙化程度，评估动脉粥样硬化和心血管疾病风险的量化指标。）血清肌钙蛋白I测定（cTnI）及心肌酶 都可以很好的检测心肌损伤或心肌梗死的重要				
	心血管检测	超敏C反应蛋白（hs-CRP）		是判断组织损伤的敏感指标，也是心血管炎症病变的生物标志物。在冠心病、脑卒中、周围血管栓塞等疾病的诊断和预测中发挥重要的作用。	
		冠状动脉钙化评分		冠状动脉钙化积分是评估冠状动脉钙化程度的一个量化指标，可作为冠心病风险预测的参考因素。	
		血清肌钙蛋白I测定（cTnI）		是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。	

	心肌酶	CK	是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。
	心肌酶	CK-MB	是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。
加项包五： 代谢（甲状腺）升级包	代谢项目检查（TPO-Ab具有重要的临床意义，是诊断甲状腺疾病的重要指标之一。TG-Ab甲状腺机能亢进的患者基础代谢率会升		
	甲状腺两项	甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab）	是人体内针对甲状腺过氧化物酶（TPO）产生的自身抗体，主要用于评估甲状腺自身免疫性疾病。TPO-Ab升高常见于桥本甲状腺炎、Graves病、甲状腺功能减退或亢进等疾病，也可见于部分孕妇或健康人群。检测TPO-Ab有助于辅助诊断、评估疾病进展及妊娠期甲状腺功能异常风险。
		抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）	抗甲状腺球蛋白抗体（TgAb）是人体免疫系统产生的一种自身抗体，主要针对甲状腺产生的甲状腺球蛋白（Tg）。它的异常升高通常提示甲状腺自身免疫性疾病，如桥本甲状腺炎、Graves病等，也可能影响甲状腺功能检测的准确性。
	肾功能	尿微量白蛋白与尿肌酐比值测定	对早期筛查及诊断各种原因引起的早期肾损伤有重要的意义，适用于糖尿病肾病，高血压受检者，心血管和肾病高风险人群及健康人群肾病早期筛查。
		血清胱抑素C测定	作为肾脏功能的一个敏感特异性指标，可作为高血压肾病、糖尿病肾病及其他肾小球早期损伤的辅助评价指标。
加项包六： 妇科升级包（仅女性）	鳞状上皮细胞癌相关抗原测定(SCC)宫颈癌尤其对中老年患者的诊断敏感性较高。定期监测SCC有助于早期发现肿瘤复发，例如宫颈		
	妇科血液筛查	鳞状上皮细胞癌相关抗原测定(SCC)	有助于鳞状上皮细胞起源的肿瘤的初步筛查，可作为肺鳞癌、宫颈癌、食管癌等的诊断、病情监测及预后判断的辅助指标。

2026二工大教职工健康体检B套餐正高（瑞慈）					
体检项目		男性	女性		临床意义
			未婚	已婚	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）	●	●	●	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科检查	心、肺听诊，腹部触诊	●	●	●	心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科检查	浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	●	●	●	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形、皮肤有无异常改变等
眼科	视力检查(必选)	●	●	●	视力是否正常
	眼科检查(外眼)(必选)	●	●	●	眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等
	眼底检查(眼底)	●	●	●	眼底有无黄斑变性和动脉硬化等
	测眼压	●	●	●	眼压是否正常，排除原发性青光眼、原发性视网膜剥离等疾病
耳鼻喉检查	外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部	●	●	●	耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等
妇科（已婚项目）	常规检查（必选）			●	女性生殖器有无异常病变，有无宫颈炎及阴道感染等。
	白带常规（必选）				
	液基薄层细胞学检测（TCT）			●	宫颈癌筛查，比宫颈刮片灵敏度高，准确性好。
	HPV-DNA(16/18)			●	筛查宫颈癌高危人群的重要指标。
血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	●	●	●	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，炎症感染等。
肝功能	血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)	●	●	●	是肝细胞受损最敏感的指标，升高：主要见于急性传染性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎，胆囊炎等。
	血清门冬氨酸氨基转移酶（AST）	●	●	●	可以检测肝细胞、心肌细胞受损情况。
	血清γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)	●	●	●	是用于诊断肝、胆系统疾病的敏感指标，酒精性肝损伤的监测指标。
	血清碱性磷酸酶(ALP)	●	●	●	是肝胆系统和骨骼系统疾病诊断的酶学指标
	血清总胆红素(T-BIL)	●	●	●	总胆红素升高提示有黄疸，包括肝细胞性黄疸，阻塞性黄疸，溶血性黄疸。
肾功能	血清尿素（必选）	●	●	●	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，尿毒症等。
	血清肌酐（必选）				
	血清尿酸	●	●	●	可提示嘌呤代谢有无异常，升高常见于如高尿酸血症、痛风及肾功能损害等。
血脂	1.总胆固醇(TC)	●	●	●	胆固醇升高是导致高血压、冠心病、心肌梗死、动脉粥样硬化的 高度危险因素。
	2.甘油三脂（TG）	●	●	●	甘油三脂升高见于：肥胖症，脂肪肝，糖尿病，动脉粥样硬化，高血压等。
	3.高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	●	●	●	高密度脂蛋白胆固醇认为是抗动脉硬化的保护因素。降低是冠心病、脑血管疾病的危险因子。
	4.低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	●	●	●	LDL-C是坏胆固醇，升高是冠心病、心肌梗死、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素。
	5.动脉粥样硬化指数(1-4必选)	●	●	●	动脉粥样硬化指数升高，发生冠心病的危险性也升高。
血糖	空腹血糖(FPG)	●	●	●	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病，了解血糖控制情况等。
	糖化血红蛋白（HbA2c）	●	●	●	可反映检查前1-2个月的平均血糖水平，是糖尿病的筛查指标之一
甲状腺功能五项	T3 T4 TSH FT3 FT4	●	●	●	是诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能减退等疾病的指标。
肿瘤标志物（男5项）	AFP、CEA、CA199、PSA、FPSA、PSA/FPSA	●			一次同时检测五项肿瘤标志物，升高可提示肝癌、肺癌、前列腺癌、胰腺癌等。
肿瘤标志物（女5项）	AFP、CEA、CA19-9、CA125、CA15-3		●	●	一次同时检测五项肿瘤标志物，升高可提示肝癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等。
尿常规	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查。	●	●	●	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等。
心电图	心电图	●	●	●	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
低剂量螺旋CT	肺部	●	●	●	最主要的是可以早期发现肺部疾病，包括肺部的炎症等其他性病变。
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾彩超	●	●	●	检查肝胆脾胰肾各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	甲状腺超声	●	●	●	检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等
	前列腺超声	●			检查前列腺是否有增生或肿瘤。
	双侧乳房超声		●	●	检查乳腺是否有结节或乳腺癌。
	子宫附件超声		●		检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
	阴超（已婚项目）			●	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
幽门螺旋杆菌检查	C-13（呼气）	●	●	●	是幽门螺旋杆菌感染的确诊试验。此菌感染与胃炎、胃溃疡、胃癌等发病有密切关系。
骨密度超声	超声检测	●	●	●	诊断骨质疏松，预测骨折风险。
	颈动脉彩超检查	●	●	●	了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉斑块和颈动脉血流情况。

高 清 彩 色 多 普 勒 B 超 (二选一)	心脏彩超	●	●	●	心血管疾病的重要诊断方法，对心脏瓣膜病诊断准确率高,对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的辅助诊断价值。
血流变	血粘度检测	●	●	●	了解血液黏度变化，主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。
心脑血管疾病风险指标	同型半胱氨酸(HCY)	●	●	●	血同型半胱氨酸升高的高血压，称为为H型高血压，它是脑卒中等心脑血管疾病的独立危险因素。
胃功能	胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、PGⅠ/PGⅡ比值	●	●	●	PGⅠ、PGⅠ/PGⅡ比值测定，可用于胃溃疡、萎缩性胃炎、胃癌的初筛。
	胃泌素17（G-17)	●	●	●	G-17是评估胃窦部黏膜功能的指标，G-17升高常见于胃十二指肠溃疡、萎缩性胃炎、幽门螺旋杆菌感染及胃癌等。
肿瘤标志物	糖链抗原242（CA242)	●	●	●	与胰腺癌、结肠癌、胃癌等胃肠道恶性肿瘤相关，但胃肠道良性疾病也可见升高。
	糖链抗原72-4（CA72-4)	●	●	●	是胃肠道恶性肿瘤标志物，也是检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可见升高。
早餐		●	●	●	
报告	电子及纸质报告	●	●	●	
赠送下列加项包六选一					
加项包一： 核磁加项包 (头颅或头颅血管核磁二选一)	核磁包1：核磁检查（MRI能清晰区分灰质、白质、脑室、脑沟等结构，帮助发现微小病变（如早期脑梗死、脑炎病灶）				
	核磁检查	头颅核磁		头颅MRI是借助磁场和射频波对人体脑部进行高分辨率断层成像的技术，主要用于评估脑组织结构、诊断病变（如肿瘤、血管异常）、追踪疾病进展及指导治疗，具有无辐射、软组织对比度高的优势。	
	核磁包2：核磁检查（检测动脉粥样硬化导致的血管狭窄（如颈动脉、大脑中动脉），或急性脑梗死的责任血管闭塞，评估脑血流代偿情况。）				
	核磁检查	头颅血管核磁		颅内血管核磁（MRA/MRI）主要用于检查脑血管结构及血流异常，包括动脉瘤、血管畸形、狭窄或闭塞、动脉粥样硬化等，具有无创、高分辨率的特点，是筛查和诊断脑血管疾病的重要工具。	
加项包二： CT扩展包 (颈椎或腰椎CT二选一)	颈椎CT 可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断。				
	CT放射检测	颈椎CT		CT具有扫描速度快，覆盖面积大，采集信息量多等优点，在短时间内能够对全身各脏器进行检查，可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断；特别是对早期病变的发现、已患疾病疗效判定等有着显著的临床意义。	
	腰椎CT 可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断。				
	CT放射检测	腰椎CT		CT具有扫描速度快，覆盖面积大，采集信息量多等优点，在短时间内能够对全身各脏器进行检查，可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断；特别是对早期病变的发现、已患疾病疗效判定等有着显著的临床意义。	
加项包三： 肿瘤升级包	(NSE)作为一种糖酵解途径关键酶，主要分布于神经及神经内分泌组织，其血清水平异常升高常提示小细胞肺癌等神经内分泌肿瘤的存在。				
	肿瘤标志物	神经元特异性烯醇化酶（NSE)		对小细胞肺癌、神经母细胞瘤的早期诊断及评估预后具有临床重要意义。	
	肿瘤标志物	细胞角蛋白19片段测定（CYFRA21-1)		对非小细胞肺癌比较敏感，尤其是肺鳞癌。	
	肿瘤标志物	β2微球蛋白检测（β2-MG)		用于监测与评价肾功能状态的一个指标，炎症（一般上尿路感染）、肾衰、肾炎、肾脏肿瘤可能会导致该指标异常。	
加项包四： 心脑血管升级包	心血管检查，超敏C反应蛋白（CRP是肝脏合成的急性期反应蛋白，在感染、创伤或炎症时迅速升高。冠状动脉钙化程度，评估动脉粥样硬化和心血管疾病风险的量化指标。）血清肌钙蛋白I测定（cTnI）及心肌酶 都可以很好的检测心肌损伤或心肌梗死的重要指标。				
	心血管检测	超敏C反应蛋白（hs-CRP)		是判断组织损伤的敏感指标，也是心血管炎症病变的生物标志物。在冠心病、脑卒中、周围血管栓塞等疾病的诊断和预测中发挥重要的作用。	
		冠状动脉钙化评分		冠状动脉钙化积分是评估冠状动脉钙化程度的一个量化指标，可作为冠心病风险预测的参考因素。	
		血清肌钙蛋白I测定（cTnI)		是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。	
	心肌酶	CK		是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。	
	心肌酶	CK-MB		是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。	
加项包五： 代谢（甲状腺）升级包	代谢项目检查（TPO-Ab具有重要的临床意义，是诊断甲状腺疾病的重要指标之一。TG-Ab甲状腺机能亢进的患者基础代谢率会升高，而甲状腺机				
	甲状腺两项	甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab)		是人体内针对甲状腺过氧化物酶（TPO）产生的自身抗体，主要用于评估甲状腺自身免疫性疾病。TPO-Ab升高常见于桥本甲状腺炎、Graves病、甲状腺功能减退或亢进等疾病，也可见于部分孕妇或健康人群。检测TPO-Ab有助于辅助诊断、评估疾病进展及妊娠期甲状腺功能异常风险。	
		抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab)		抗甲状腺球蛋白抗体（TgAb）是人体免疫系统产生的一种自身抗体，主要针对甲状腺产生的甲状腺球蛋白（Tg）。它的异常升高通常提示甲状腺自身免疫性疾病，如桥本甲状腺炎、Graves病等，也可能影响甲状腺功能检测的准确性。	
	肾功能	尿微量白蛋白与尿肌酐比值测定		对早期筛查及诊断各种原因引起的早期肾损伤有重要的意义，适用于糖尿病肾病，高血压受检者，心血管和肾病高风险人群及健康人群肾病早期筛查。	
		血清胱抑素C测定		作为肾脏功能的一个敏感特异性指标，可作为高血压肾病、糖尿病肾病及其他肾小球早期损伤的辅助评价指标。	
加项包六：	鳞状上皮细胞癌相关抗原测定(SCC)宫颈癌尤其对中晚期患者的诊断敏感性较高。定期监测SCC有助于早期发现肿瘤复发，例如宫颈术后患者SCA				

加项包八：			
妇科升级包（仅女性）	妇科血液筛查	鳞状上皮细胞癌相关抗原测定(SCC)	有助于鳞状上皮细胞起源的肿瘤的初步筛查，可作为肺鳞癌、宫颈癌、食管癌等的诊断、病情监测及预后判断的辅助指标。